

Revers bei Prämedikation (Analgoesedierung)

**(Verabreichung eines Beruhigungsmittels in die Vene)
vor Magen -, oder Darmspiegelung**

Auf Wunsch kann, wenn keine Kontraindikation vorliegt, der Arzt vor der Untersuchung ein Beruhigungsmittel (Metazolom, Dormicum®) verabreichen.

Dieses Medikament ist **stark beruhigend, schlaffördernd und muskelentspannend.**

Nebenwirkungen: (welche nur selten auftreten):
Überempfindlichkeitsreaktion, Störung der Atmung und der Herztätigkeit, Verwirrtheit und Gedächtnisstörungen, sowie paradoxe Wirkungen (Erregung, Muskelzuckungen).

Da **das Medikament auch nach der Untersuchung zu Beeinträchtigungen** führen kann, ist mit vermehrter **Müdigkeit, Konzentrationsstörungen und Schwindel** zu rechnen. Deshalb ist die **selbstständige Teilnahme am Straßenverkehr** und **das Bedienen von Maschinen nicht erlaubt.**

Eine Begleitperson für die Heimfahrt ist notwendig und wird vom Arzt od. einer Dipl. Sr. aufgeklärt.

Datum:

Unterschrift des Patienten:

Unterschrift der Begleitperson: